

病名	主な症状	潜伏期間	感染しやすい期間	登園許可書	登園の目安
麻疹（はしか）	熱・発疹	8～12日	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	様式1	解熱後3日経過してから
風しん（三日はしか）	熱・発疹	16～18日	発しん出現の前7日から後7日間くらい	様式1	発しんが消失してから
水痘（水ぼうそう）	熱・発疹	14～16日	発しん出現1～2日前からすべての発しんが痂皮化するまで	様式1	全ての発疹が痂皮化（かさぶた）するまで
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	熱 耳下腺腫脹	16～18日	耳下腺の腫脹前3日から腫脹出現後4日間	様式1	耳下腺腫脹が発現してから5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
急性出血性結膜炎	目の充血・異物感 眼脂・腫脹	1～3日	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月排出される	様式1	医師において感染の恐れがないと認められるまで
咽頭結膜熱（プール熱・アデノウイルス）	熱・咽頭炎 結膜炎	2～14日	咽頭から2週間、糞便から数週間排泄される	様式1	主な症状（発熱、咽頭発赤、眼の充血）が消失してから2日経過するまで
流行性角結膜炎	流涙・眼脂 結膜充血	2～14日	発症後2週間	様式1	医師において感染の恐れが無いと認められるまで
百日咳	咳発作	7～10日	初期咳出現 2週間	様式1	特有な咳が消退し、全身状態が良い
腸管出血性大腸菌感染症（O157、O26、O111等）	腹痛・血便 水様便	3～4日	便中に菌が排泄されている期間	様式1	症状が治まり、薬服用終了（48H空けて連続2回の検便（-））
インフルエンザ	突然の高熱	1～4日	症状がある期間 （発症前24時間から発病後3日程）	様式2	発症した後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで
溶連菌感染症	発熱・咽頭痛 発疹（いちご様）舌	2～5日	抗菌薬内服後24Hが経過するまで	様式2	抗菌薬内服24～48H経過（治療継続要）
マイコプラズマ肺炎	咳・発熱 頭痛	2～3週間	症状発現時 （4～6週間続く）	様式2	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	水疱性発疹 <small>（口内面・手のひら・足の裏）</small>	3～6日	唾液からの感染（1週間以内） 糞便からの感染（数週間持続）	様式2	発熱なく（解熱後1日以上経過）普段の食事ができる
りんご病（伝染性紅斑）	頬が赤くなったり、手足に網目状の紅斑出現	4～14日	風邪症状発現から顔に発疹が出現するまで	様式2	全身状態が良い（発疹出現時は感染力消失）
ウイルス性腸炎（ノロ・ロタ・アデノウイルス）	熱 嘔吐 下痢（白色便）	1～3日	症状のある時期	様式2	嘔吐・下痢が治まり、普通の食事ができる
ヘルパンギーナ	高熱・咽頭痛、口垂垂付近に水疱、潰瘍	3～6日	唾液からの感染（1週間以内） 糞便からの感染（数週間持続）	様式2	発熱なく（解熱後1日以上経過）普段の食事ができる
RSウイルス感染症	発熱・鼻汁・咳嗽 喘鳴・呼吸困難	3～8日	呼吸器症状のある間	様式2	重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
とびひ	びらん 掻痒・水疱	2～10日	抗菌薬内服後24Hが経過するまで	様式2	皮膚が乾燥し、抗菌薬内服24H経過している場合は登園可